

+33 (0)4 50 79 69 60
info@drdewulf.com

www.drdewulf.com

TRAITEMENT des LÉSIONS VASCULAIRES et PIGMENTAIRES par

la PLATEFORME ICON : MaxG



Principe :

La pièce à main MaxG utilise la technologie de la Lumière Pulsée Optimisée (OPL), unique à la plateforme ICON.

Grâce à sa technologie brevetée «Photon Recycling», le système de refroidissement et le «Smooth Pulse», la lumière pulsée optimisée de la MaxG présente plus de sécurité et moins de douleurs que des lumières pulsées intenses (IPL) classiques.

Elle présente un double spectre d'absorption. La première se situe entre 870 – 1200 nm visant la mélanine des taches pigmentaires et la deuxième se situe entre 500 – 670 nm visant l'hémoglobine dans les vaisseaux sanguins.

Pour cette raison, la MaxG permet le traitement de certaines lésions pigmentaires, comme des lésions vasculaires.

Indications :

Les indications pigmentaires de la MaxG sont les lentigos solaires, les taches pigmentaires liées à une exposition chronique au soleil et au vieillissement de la peau. Les zones les plus fréquemment traitées pour cette indication sont les mains, le décolleté et le visage.

Les lésions vasculaires, tels que la couperose et la rosacée, les télangiectasies sur le visage, les points rubis (points rouges) ou encore la poikilodermie sont efficacement traités avec cette technologie.

Consignes avant la séance

La zone à traiter doit impérativement être démaquillée et sèche. La peau devra être la plus débronzée possible. Dès lors, le traitement des taches pigmentaires, comme des lésions vasculaires **ne se fait pas en saison d'été.**

Pendant la séance

Le port de coques est OBLIGATOIRE pendant le traitement avec la OPL.

Une sensation claquement est ressentie à chaque pulse. Elle est variable selon l'intensité utilisée et selon les patients et ne dure pas dans le temps.

Les suites immédiates

Pour les lésions pigmentaires :

Les taches mélaniques traitées peuvent devenir davantage plus sombres et visibles dans les jours après la séance, pour se transformer en micro-crotelles qui disparaissent quelques jours plus tard.

En général, l'efficacité est davantage importante sur les taches plus foncées avec une disparition totale de ces taches, contrairement aux taches plus claires qui s'atténueront seulement.

Une crème hydratante et apaisante, de même qu'une crème solaire seront appliquées immédiatement après la séance.

Pour des lésions vasculaires :

La zone traitée est marquée par un érythème (rougeur) et un œdème localisé qui disparaissent habituellement dans les heures suivant la séance.

Une coloration grisâtre peut apparaître immédiatement après la séance et peut durer quelques jours

Une crème hydratante et apaisante, de même qu'une crème solaire seront appliquées immédiatement après la séance.

Consignes après la séance

- L'application d'une crème hydratante et apaisante sera prescrite pendant 48 heures.

- La protection solaire par écran total est indispensable dans les suites du traitement.

Nombre de séances :

Le traitement est réalisé généralement en 2 à 3 séances espacées d'un mois environ, sans aucune anesthésie.

Contre-indications :

- phototype IV - V - VI
- hypersensibilité connue à la lumière,
- prise de médicaments favorisant la sensibilité à la lumière ou à base de bêta-carotène,
- prise d'anticoagulants,
- prise de capsules d'Isotrétinoïne au cours des six derniers mois,
- le bronzage ou l'application de produits auto bronzants,
- la grossesse.

Les complications possibles

Les complications telles que brûlures superficielles et hyper- comme hypopigmentation sont possibles mais rares, plus importantes en cas de peau bronzée.

Absence de cotation de cet acte médical à la nomenclature de la Sécurité Sociale.
Aucun remboursement n'est possible et aucun arrêt de travail ne peut être accordé.

INSTRUCTIONS DE PRE ET POST TRAITEMENT

Précautions à prendre AVANT le traitement Max G:

- Ne pas s'être exposé au **soleil**, aux cabines d'UV et ne pas avoir utilisé de crème auto bronzante. L'exposition solaire réduit l'efficacité du traitement laser et augmente les risques de complications post traitement.
- Appliquer un **écran total d'indice 50+** quand la zone à traiter est exposée au soleil.

- Enlever tout maquillage, crème ou huile avant le traitement.

Précautions à prendre APRES le traitement MaxG :

- Ne pas **gratter ni frotter** la zone traitée,
- Pas de natation ni de spa/jacuzzi tant que la rougeur est présente, ni pendant les 24 – 48 heures suivant le traitement,
- Appliquer une **crème hydratante** deux fois par jour tant que la rougeur persiste,
- En cas d'apparition de **croûtes**, ne pas raser ni gratter la zone. La maintenir hydratée et laisser les croûtes tomber d'elles-mêmes,
- Un **maquillage** léger est possible, à enlever avec un coton doux et une lotion démaquillante,
- **Contactez votre Médecin** si des effets secondaires apparaissent (rougeurs, relâchement ou suintement),
- Eviter toute exposition solaire. Si la zone est exposée au soleil, utiliser une **protection solaire** d'indice 50+.

J'ai pris connaissance de ces informations et j'ai compris le déroulement, les précautions et les suites et les complications possible.

Nom et Prénom :

Date :

Signature :