



miraDRY® est un traitement non chirurgical révolutionnaire approuvé par la FDA pour la réduction permanente de la transpiration, des odeurs et de la pilosité des aisselles, en 90 minutes seulement. Plus de 300 000 traitements miraDRY® ont été réalisés dans le monde entier.

Bien que le corps humain ait besoin de glandes sudoripares pour se refroidir, il en dispose d'environ 2 à 4 millions, dont seulement 2% se trouvent sous les aisselles. Le fait d'éliminer une grande partie de ces 2% de glandes sudoripares n'a aucun impact sur la capacité de votre corps à se refroidir. miraDRY® apporte d'autres avantages associés à la réduction de la transpiration des aisselles, comme la réduction des odeurs désagréables et la pilosité sous les bras. Après le traitement, on continue à transpirer ailleurs de façon normale.

La technologie miraDRY® utilise l'énergie thermique pour chauffer la zone où se trouvent les glandes sudoripares, odorantes et folliculaires gênantes et les élimine en toute sécurité.

Les résultats sont immédiats. Une période d'environ 3 mois est néanmoins nécessaire afin de trouver le résultat stable dans le temps. Une fois que miraDRY® a éliminé les glandes sudoripares, elles ne repoussent pas. Des études cliniques indiquent une réduction moyenne de la transpiration de 82%. Comme tout traitement esthétique, l'expérience et les résultats des patients peuvent être variables.

Le plus souvent un seul traitement miraDRY® suffit afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, comme pour tout traitement esthétique, votre médecin déterminera le meilleur protocole en fonction des résultats escomptés.

La durée du traitement miraDRY® est en moyenne de 90 minutes, dépendant de la taille des aisselles. Le traitement s'effectue entièrement au cabinet du Dr. De Wulf. Durant le traitement miraDRY® 3 étapes s'effectuent : 1. anesthésie locale des aisselles, 2. application du calque adapté à la taille des aisselles et 3. traitement de la zone avec miraDRY®. Le traitement est indolore et ne nécessite aucune interruption des activités professionnelles. Le sport ou autres activités physiques intenses sont à éviter pendant environ 2 semaines.

La zone traitée peut être légèrement gonflée et sensible. Elle peut également présenter un hématome et une sensation d'engourdissement. Ces effets secondaires s'estompent généralement en quelques jours à quelques semaines. Une diminution de la sensibilité cutanée des aisselles ou

du haut du bras est également temporaire. Dans des rarissimes cas, la formation d'un abcès peut être possible. Une hyperhidrose compensatoire sur une autre zone du corps est rare et reste difficile à démontrer.

miraDRY® est la seule technologie disponible actuellement permettant la réduction de transpiration de façon non-invasive et avec un effet durable.

Date :

Nom et Prénom :

Signature :